

เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตในกรณีมีการใช้ยา

1. Allergy and/or medicines (Antihistamines) (โรคภูมิแพ้ และ/หรือ มีการใช้ยาแก้แพ้)

รับ	ถ้าในวันทีบริจาคไม่มีอาการของโรคภูมิแพ้ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และผู้บริจาครู้สึกสบายดี สามารถบริจาคได้ หากมีการใช้ steroids ร่วมด้วย ทั้งชนิดรับประทาน และฉีดในการรักษา ให้หยุดใช้ยา steroids ก่อนอย่างน้อย 7 วัน จึงจะสามารถบริจาคได้
-----	--

2. Anti-acne

2.1 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีสิว ได้แก่ Minocycline, Doxycycline, Erythromycin, Lymecycline, Oxytetracycline เป็นต้น

รับ	ทั้งชนิดรับประทานและทา ในการป้องกันการติดเชื้อในกรณีเป็นสิว
-----	---

2.2 Retinoids (กลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอ)

รับหลังหยุดยา	ต้องหยุดยาก่อนการบริจาค เนื่องจากยาในกลุ่มนี้ มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ - Isotretinoin ต้องหยุดก่อนการบริจาคอย่างน้อย 1 เดือน - Acitretin ต้องหยุดก่อนการบริจาคอย่างน้อย 2 ปี
ไม่รับถาวร	กรณีที่เคยได้รับ และ/หรือใช้ยา etretinate ให้งดบริจาคเลือดถาวร

3. Antibiotics กรณีป้องกันการติดเชื้อในภาวะอื่น ๆ รวมทั้งใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อต่าง ๆ

รับ	- เมื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับทันตกรรม เช่น โรคปริทันต์อักเสบ หรือก่อนการทำทันตกรรมอื่น ๆ - เมื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในโรคต่าง ๆ เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น
รับหลังหยุดยา	- การใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อต่าง ๆ ต้องมีระยะหยุดยามาแล้ว ดังนี้ - หากได้รับยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ต้องหยุดยามาอย่างน้อย 5 วัน จึงจะสามารถบริจาคได้ - หากได้รับยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ต้องหยุดยามาอย่างน้อย 10 วัน จึงจะสามารถบริจาคได้ - หากเคยมีการติดเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องสิ้นสุดการรักษาอย่างน้อย 5 วัน และหายจากโรคมาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

4. Antifungals

รับหลังหยุดยา	- กรณีที่เป็นยารับประทานต้องหยุดยาอย่างน้อย 7 วันก่อนบริจาค - กรณีที่เป็นยาทา สามารถบริจาคได้
---------------	--

5. Anticoagulation agents

ไม่รับ	หากผู้ป่วยจាកอยู่ในระหว่างการใช้ยาในกลุ่ม anticoagulation agents ให้งดบริจาค
รับ	กรณีเป็นการใช้ยา Aspirin โดยที่ <ul style="list-style-type: none"> - สามารถบริจาค และนำไปใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง - หากต้องการบริจาคเกล็ดเลือดแบบ apheresis ต้องหยุดยาอย่างน้อย 2 วันก่อนบริจาค

6. Anti-diabetic agents

6.1 Insulin except Bovine (ยาฉีดอินซูลิน)

รับ	เมื่อเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน พบประมาณ 90% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ถ้าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างคงที่ สามารถบริจาคได้
ไม่รับ	เมื่อเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 คือภาวะที่ร่างกายไม่สร้างอินซูลิน พบในเด็กและผู้ใหญ่ที่อายุน้อย

6.2 Oral medication (ยาชนิดรับประทาน)

รับ	<ul style="list-style-type: none"> - หากใช้การควบคุมระดับน้ำตาลด้วยยารับประทานโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใด ๆ เช่น ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น - หากเป็นผู้ที่เคยมีประวัติระดับน้ำตาลในเลือดสูงในบางช่วง ได้แก่ เบาหวานในภาวะตั้งครรภ์ หรือ pre-diabetes (abnormal blood sugar) เมื่อระดับน้ำตาลกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว สามารถบริจาคได้
-----	--

7. Anti-arthritis

รับหลังหยุดยา	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องไม่มีอาการของโรค - กรณีที่ใช้ยากกลุ่ม Anti-inflammatory/NSAIDs ให้ใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง - หากมีการใช้ยา steroids (steroid injection) ให้หยุดยาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการบริจาค - หากมีการรักษาด้วย gold therapy ต้องสิ้นสุดการรักษามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนการบริจาค
---------------	---

8. Anti-gout agents

รับหลังหยุดยา	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องไม่มีอาการของโรค - กรณีที่ใช้ยากกลุ่ม Anti-inflammatory/NSAIDs ให้ใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง - หากมีการใช้ยา steroids (steroid injection) ให้หยุดยาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการบริจาค
---------------	---

9. Antihyperlipidaemic reducing agents

รับ ยกเว้น มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (coronary artery disease) โรคหลอดเลือดในสมองตีบ เป็นต้น ให้งดรับ
ปรึกษา

10. Antihypertensive agents

รับ โดยที่ไม่ต้องพิจารณาชนิดของยาที่ใช้ ให้พิจารณาจากระดับความดันเลือดที่ควบคุมได้ โดย systolic ไม่มากกว่า 160 และ diastolic ไม่มากกว่า 100 และต้องปราศจากภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจเบาหวาน หรือมีการทำงานของไตบกพร่อง เป็นต้น

11. Antimalarial agents

รับ

- หากใช้ยาต้านมาลาเรียเพื่อรักษา ต้องหายจากโรคและหยุดใช้ยาแล้วอย่างน้อย 3 ปี จึงจะสามารถรับปรึกษาได้
- หากใช้ยาต้านมาลาเรียเพื่อป้องกัน ไม่ต้องพิจารณาชนิดของยาที่ใช้ให้พิจารณาจากสถานที่ที่เดินทาง/ที่อยู่ และหากมีการเดินทาง/อาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีการระบาด ให้เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน หลังกลับจากสถานที่นั้น

12. Antiplatelet medicines

รับหลังหยุดยา

- ถ้าไม่ได้หยุดยาสามารถรับปรึกษาได้ แต่นำไปใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง
- หากต้องการรับปรึกษาเกล็ดเลือดแบบ apheresis ต้องหยุดยาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนรับปรึกษา

13. Anti-psychotic agents

ไม่รับ เนื่องจาก ผู้รับปรึกษาจำเป็นต้องรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง และอาจเกิดอาการคลุ้มคลั่งขณะรับปรึกษาได้

14. Anti-anxiety agents, Antidepressants and Anti-insomnia agents

รับ เมื่อใช้ยามาแล้วอย่างน้อย 14 วัน ไม่มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา และไม่มีอาการของโรค เช่น อาการกังวล (over-anxious) อาการซึมเศร้า (depressed) อาการฟุ้งฟ่วน (manic) เป็นต้น

15. Anticonvulsants

รับหลังหยุดยา เมื่อไม่มีอาการของโรค และสามารถหยุดยาได้อย่างน้อย 3 ปี

16. Aspirin and NSAIDs ที่นอกเหนือจากการใช้ใน Arthritis

รับหลังหยุดยา

สำหรับผู้ที่ใช้ Aspirin

- ถ้าไม่ได้หยุดยา สามารถรับปรึกษาได้และนำไปใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง

- หากต้องการบริจาคเกล็ดเลือดแบบ apheresis ต้องหยุดยาอย่างน้อย 2 วันก่อนบริจาค

สำหรับผู้ที่ใช้ NSAIDs

- ถ้าไม่ได้หยุดยา สามารถบริจาคได้และนำไปใช้ได้เฉพาะเม็ดเลือดแดง
- หากต้องการบริจาคเกล็ดเลือดแบบ apheresis ต้องหยุดยาอย่างน้อย 2 วันก่อนบริจาค

ไม่รับ

สำหรับผู้ที่ใช้ Aspirin ในกรณีที่ทำ Bypass แล้วต้องชียานี้เป็นประจำ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแก่ผู้บริจาคได้

17. Bronchodilators and decongestants

รับ

- เมื่อไม่มีอาการของโรค/อาการของโรคสามารถควบคุมได้ด้วยยาที่ไม่ใช่ steroids หรือ steroids ชนิดสูดพ่นเท่านั้น

ไม่รับ

- เมื่อยังแสดงอาการของโรค
- เมื่อมีการใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันตั้งแต่ 3 สัปดาห์ ภายใน 6 เดือนก่อนหน้า
- เมื่อมีการใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือน ภายใน 12 เดือนก่อนหน้า
- เมื่อมีการใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันน้อยกว่า 3 สัปดาห์ ภายใน 7 วันก่อนหน้า

18. Contraceptive agents

รับ

รับบริจาคทุกรูปแบบ และต้องไม่มีอาการแทรกซ้อนในกรณีที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฝังหรือชนิดฉีด

19. Dermatologicals

รับ

เมื่อผิวหนังบริเวณนั้นไม่ได้ส่งผลต่อการเจาะเก็บโลหิต ไม่มีการติดเชื้อ ไม่มีอาการทางระบบของร่างกาย (systemic symptoms) หรืออาการแทรกซ้อนอื่น ๆ และไม่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive) หรือยาในกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A (retinoids) ร่วมด้วย

ไม่รับ

เมื่อผู้บริจาคเป็นโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับอาการทางร่างกายอื่น (systemic disease) เช่น Scleroderma, SLE, Dermatomyositis และ Systemic cutaneous amyloidosis

20. Dieting

รับ

เมื่อผู้บริจาคมีน้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป และไม่มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา

21. Eye preparations

รับ

-

22. Gastrointestinal medications

รับ เมื่อสามารถควบคุมอาการได้ ไม่อยู่ในระหว่างการหาสาเหตุของโรค กระเพาะ ไม่ได้วางแผนในการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด และไม่มีการทำ endoscopy อย่างน้อย 4 เดือนก่อนบริจาค

23. Hair loss treatment medicines

รับหลังหยุดยา

- กรณีที่ใช้ยาฆ่าเชื้อรา (antifungal) ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 7 วัน และไม่มีอาการแล้วอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งรวมถึงการใช้ shampoos หรือ lotions ที่มียาฆ่าเชื้อราอยู่ด้วย
- Finasteride ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
- Dutasteride ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
- ถ้าใช้ยา steroids ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน

24. Heart Disease and Medications

ไม่รับ เมื่อเป็นโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Angina Pectoris, Atrial Fibrillation, Atrial Flutter, Atrial Tachycardia, AV-Block เป็นต้น เนื่องจากอาจทำให้ผู้บริจาคอาการกำเริบหรือแย่ลงได้

25. Hormones

รับ กรณีที่ใช้ Hormone replacement therapy (HRT) สำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือนเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

ไม่รับ กรณีที่ใช้ Testosterone replacement therapy (TRT) ในกรณี ชายข้ามเพศ (transgender man) เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

- (1) ผู้บริจาคใช้ฮอร์โมนนี้ในระดับสูงและต่อเนื่อง เมื่อนำโลหิตไปใช้กับหญิงตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดการพิการของทารกในครรภ์ (Birth defect) และอาจมีผลต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก
- (2) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด TRALI (Transfusion-related acute lung injury) เนื่องจากผู้บริจาคกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเคยตั้งครรภ์มาก่อน อาจมีโอกาสร่างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด (Anti-HLA, Anti-neutrophil, Anti-platelet)

หมายเหตุ: หากธนาคารเลือดใด ต้องการรับบริจาคโลหิตจากผู้บริจาคที่ใช้ Testosterone replacement therapy (TRT) ในกรณีชายข้ามเพศ (transgender man) สามารถทำได้ แต่แนะนำให้นำไปใช้เฉพาะเม็ดเลือดแดง

ในกรณีของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ไม่รับ เนื่องจาก ถ้ามีการบริจาคหลายประเภท จะทำให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความซับซ้อนอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ ได้

26. Immunization

รายการยา	รับ/ไม่รับ	คำอธิบายเพิ่มเติม
26.1 Vaccines with attenuated bacteria and viruses		
Anthrax, Live attenuated typhoid fever vaccine	รับ	ไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
BCG, Poliomyelitis (injection), Live attenuated cholera vaccine, Japanese Encephalitis vaccine (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ), Red Measles (Rubeola), Mumps, Polio (Oral), Yellow Fever	รับ	หลังได้รับยามาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์
Chicken pox and live shingles vaccine, German Measles (Rubella), MMR (Measles, Mumps and Rubella),	รับ	หลังได้รับยามาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์
Typhoid (Oral)	รับ	หลังได้รับยามาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
26.2 Vaccines with killed bacteria		
Cholera (Oral) , Typhoid, Capsular polysaccharide typhoid fever vaccine, Meningitis, Tetanus, Shingles vaccine	รับ	ไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.3 Vaccine with inactivated viruses		
Influenza vaccine, Pneumonia vaccine	รับ	ไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.4 Toxoid		
Diphtheria, Tetanus, Diphtheria- Tetanus- acellular Pertussis vaccine	รับ	ไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
26.5 Other vaccines		
Hepatitis A vaccine	รับ	ไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน และ ไม่สัมผัสกับโรค
Hepatitis B vaccine	รับ	กรณีฉีดเพื่อป้องกัน ต้องเว้นอย่างน้อย 21 วัน
HIV vaccine	ไม่รับ ถาวร	-
HPV vaccine (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก)	รับ	ไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
Rabies vaccine ใช้ในกรณีป้องกันหรือสัมผัสเชื้อ	รับ	ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน และขาดผลจากการถูกสัตว์กัดตายแล้ว
Rocky Mountain Spotted Fever	รับ	เมื่อไม่มีอาการแทรกซ้อน
Smallpox vaccine	รับ	- หลังได้รับยามาแล้วอย่างน้อย 8 สัปดาห์ และไม่มีอาการแทรกซ้อน เช่น อาการ ทางผิวหนัง

รายการยา	รับ/ไม่รับ	คำอธิบายเพิ่มเติม
		<ul style="list-style-type: none"> - หากมีอาการแทรกซ้อนจากการได้รับวัคซีน ต้องเว้น 14 วันหลังจากที่อาการแทรกซ้อนหายดีแล้ว จึงจะรับบริจาค - หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับวัคซีนและมีอาการแทรกซ้อน ต้องเว้นอย่างน้อย 8 สัปดาห์ หลังจาก lesion แรกปรากฏ
Tick-borne encephalitis	รับ	ไม่มีอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน เว้น 1 ปี ถ้าสัมผัสกับโรค
22.6 Immunoglobulin		
HBIG	รับ	<ul style="list-style-type: none"> - เว้น 2 สัปดาห์ เมื่อฉีดเพื่อป้องกัน และไม่สัมผัสโรค - เว้น 1 ปี หลังจากได้รับ Immunoglobulin เมื่อสัมผัสโรค
HRIG	รับ	ฉีดเมื่อถูกสัตว์กัด บาดแผลหายดีแล้ว ไม่มีไข้ และไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ
Tetanus	รับ	เว้น 1 ปีหลังจากได้รับ Immunoglobulin

27. Mild analgesics and Muscle relaxants

รับ เมื่อผู้บริจาครู้สึกว่าการไม่ได้กระทบต่อกิจวัตรประจำวัน หรือผู้บริจาคสามารถขึ้นลงจากเตียงบริจาคได้เอง

28. Steroids

รับหลังหยุดยา

- หากใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันตั้งแต่ 3 สัปดาห์ ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
- หากใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือน ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน
- หากใช้ steroids ชนิดรับประทาน/ฉีดติดต่อกันน้อยกว่า 3 สัปดาห์ ต้องหยุดยามาแล้วอย่างน้อย 7 วัน

ไม่รับ กรณีที่เคยฉีด steroids หรือยาอื่นใด ที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ เนื่องจาก อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ทางเลือด โดยเฉพาะ HIV หรือไวรัสตับอักเสบบี B และ C

หมายเหตุ: พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 1 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาโรคมะเร็งแพ้
พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 7 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาโรคข้อ (arthritis)
พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 8 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาโรคเก๊าท์
พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 17 ในกรณีที่ใช้ steroids ในโรคหืด (asthma)
พิจารณาเพิ่มเติมจากข้อ 23 ในกรณีที่ใช้ steroids ในการรักษาอาการผมร่วง

29. Vitamins และอาหารเสริมต่าง ๆ

รับ

- กรณีที่ใช้วิตามิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือยาทางเลือกนั้น ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาโรคที่ห้ามบริจาคเลือด เช่น การใช้ glucosamine Sulfate ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) จะไม่รับ (พิจารณาจากสาเหตุการใช้)
- กรณีที่ใช้ไขมันปลา (fish oil) หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไขมันชั้น จะไม่ใช่เกล็ดเลือด หากต้องการบริจาคเกล็ดเลือดแบบ apheresis ต้องหยุดใช้อย่างน้อย 2 วันก่อนบริจาค

30. อื่น ๆ

การเสริมความงาม เช่น Botox, Collagen ชนิดฉีด การสักทุกชนิด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการใช้อุปกรณ์เจาะผ่านผิวหนัง

รับ

- เมื่อกระทำที่โรงพยาบาลเท่านั้น
- หากทำการฉีด ณ สถานที่อื่น ๆ ที่มีใช้โรงพยาบาล ควรเว้นอย่างน้อย 12 เดือน เนื่องจาก อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ทางเลือด โดยเฉพาะ HIV หรือไวรัสตับอักเสบบี และ C

- หากมีข้อสงสัยในการตัดสินใจคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต ให้ปรึกษาแพทย์ผู้รับผิดชอบธนาคารเลือด -

ภาคผนวก

รายการยาในแต่ละกลุ่ม ชื่อสามัญ และชื่อการค้า

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
1. Allergy and/or medicines (Antihistamines)	
Brompheniramine maleate	Bromphen, Bromamine
Cetirizine	Cerax, Cetihis, Cetrimed, Cetrine, Cetrizet, Cetrizin, Ceza, Cistamine, Cyzine, Fatec, Histica, Incidal-OD Cetirizine, Setin, Sutac, Terzine, Triz, Zensil, Zemed, Zertine, Zyrac, Zyrazine, Zyrcon, Zyrex, Zyrtec
Chlorpheniramine maleate	Chlorleate, Chlorpheno, chlorpyrimine, Cohistan, Histatapp, Kloramin, Piriton
Cyproheptadine	Cyprono, Periactin
Desloratadine	Aerius
Dimethindene maleate	Fenistil
Diphenhydramine	Benadryl
Fexofenadine	Telfast
Hydroxyzine	Abacus, Atano, Atarax, Cerax, Drazine, Hadarax, Histan, Hizin, Hydroxin, Masarax, Postarax, R- RAX, Taraxin, Trandrozine, Unamine,
Loratadine	Aller-Tab, Allerdine, Allersil, Clarid, Clarityne, Halodin, Lindine, Loradine, Loranox, Lordin, Lorita, Lorsedin, Lortadine, Ridamin, Rityne, Roletra, Tiradine, Tirlor
Mebhydrolin napadisylate	Dayhist, Posidol
Oxatomide	Tinset
Piprinhydrinate	Plokon
Promethazine	Phenergan, Titanox
2. Anti-acne	
2.1 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)	
Clindamycin	Acnocin, Clindavid, Klinna, Clinott, Rosil, Todacin
Doxycycline	Doxycom, Doxylcap, Doxyclyne, Vibramycin
Erythromycin	Erycin, Tomcin, Rintacap, E S Cap, Erimycin
Lymecycline	Tetralysal
Minocycline	Minocin, Acnamino
Oxytetracycline	Oxyclyne, O-Tetra, Oxycide, Oxynutra

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
2.2 Retinoids (กลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอ)	
Acitretin	Neotigason
Etretinate	Tigason
Isotretinoin	Roaccutane, Acnotin, Sotret, Isotane, Acnotin, A-Cnotren, Isotrex, Proacne-10, Tinoin, Retacnyl
3. Antibiotics (ยกเว้น รักษาสิว)	
Amoxicillin	Amoxi T.O., Moxatag, Amoxil, Trimox, Moxilin, Ibiamax
Amoxicillin + Clavulanic acid	Cavumox, Coklav, Fleming, Amoksiklav, Amotin 1000, Augmentin, Curam
Ampicillin	Ampicillin T P, Amicilin, Ampi Frx, Medicillin, Utocillin
Ampicillin + Sulbactam	Sulam
Azithromycin	Floctil, Azithrin, Binozyt, Atozin, Meithromax, Onzet
Cefaclor	Sifaclor, Distaclor, Vercef
Cefalexin	Ibilex, Toflex, Cephin, Keflex, Farmalex
Cefepime	Cefamax, Sefpime
Cefixime	Cefspan, Sixime
Cefoperazone + Sulbactam	Sulcef, Cefper, Cebactam, Zonbactam
Cefotaxime	Claraxim, Ceforan, Claforan, Fotax
Ceftazidime	Cef-4
Ceftriaxone	Cef-3, Trixophin
Cefuroxime	Farmacef, Furoxime, Cefurim, Neurox-250
Ciprofloxacin	Cifloxin, Ciproxyl, Ciprobay, Ciprocep, Uroxin, Cifran
Clarithromycin	Claron, Fascar, Clarith, Crixan, Klacid, Clacina
Cloxacillin	Cloxam, K-Cil, Meiclox, Cloxalin, Cloxgen
Gentamicin	Grammicin
Imipenem + Cilastatin	Sianem, Tienem, Bionem, Imcitin
Levofloxacin	Cravit, Lefloxin, Veflox, Vocin, Olfovel
Norfloxacin	Norfloxin, Norxacin, Rexacin, Sefnor
Ofloxacin	Oflocee, Ofloxin, Konovid, Viotisone
Piperacillin + Tazobactam	Peratam, Pipertaz, Tazocin, Astaz-P
Prulifloxacin	Darflox
Roxithromycin	Rothricin, Roxthrin, Coroxin, Rulid

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Sulfamethoxazole + Trimethoprim	Metrim, Bacin, Metxaprim
Vancomycin	Vancin-S
4. Antifungals	
Amphotericin B	Fungso-B, AmBisome, Amphotret, Fungso-B
Anidulafungin	Eraxis
Bifonazole	Canesten O.D.
Ciclopirox	Loprox
Clotrimazole	Canazol, Defungo, Candid, Canesten, Cotren, Chingazol
Econazole	Econ
Fluconazole	Flucozole, Flunco, Fluzoral, Diflucan, Biozole, Kyrin
Griseofulvin	Trivanex, Aofen, Fulvin, Fungivin, Grisin, K.B. Vinecin
Itraconazole	Spazol, Itracon, Spornar, Canditral, Icona
Ketoconazole	Diazon, Funginox, Ketazon, Fungazol, Kenoral, Sporoxyl
Micafungin	Mycamine
Miconazole	Nikarin, Tara, Daktarin, Funga, Funcort, Fungisil
Nystatin	Tystatin
Posaconazole	Noxafil
Terbinafine	Lamisil, EU 2000
Tolnaftate	Ezon-T
Tolnaftate + Triacetin	Alber T
Voriconazole	Vzon200, Vanazole, VFEND
5. Anticoagulation agents	
Apixaban	Eliquis
Aspirin	Asatab, Aspent-M), Aspilets, B-Aspirin
Dabigatran	Pradaxa
Dalteparin	Fragmin
Edoxaban	Savaysa
Enoxaparin	Lovenox
Fondaparinux	Arixtra
Heparin	HEP – 25
Rivaoxaban	Xarelto

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Warfarin	Befarin, Coumadin, Jantoven, Marevan
6. Anti-diabetic agents	
6.1 Insulin except Bovine (ยานี้ดอินซูลิน)	
Insulin, Insulin aspart, insulin lispro, Insulin detemir, Insulin glargine, Insulin glulisine	Insugen, Winsulin, Actrapid, Humulin R
6.2 Oral medication (ยาชนิดรับประทาน)	
Glibenclamide	Daonil, Diabenol
Gliclazide	Beclazide MR, Diamicron, Diamexon
Glipizide	Diasef, Diapazide
Metformin	Metformin GPO, Deson, Diamet
Mitiglinide	Glufast
Pioglitazone	Actos, Gitazone
Repaglinide	Novonorm
6.3 อื่น ๆ	
Exenatide	Bydureon, Byetta, Bydureon BCise
Liraglutide	Victoza, Saxenda
7. Anti-arthritis	
Acemetacin	Aceo
Capsaicin	Capsika
Diacerein	Artrodar, Diaceric
Glucosamine	Glutril, Athril, Osamine, Biotril-s, Coxium, Flexsa
Sodium hyaluronate	Hyalgan, Hyruan III, Ostenil
Tramadol	Amanda, Analab
Tramadol + Paracetamol	Duocetz
NSAIDs (Non-steroidal Anti-inflammatory drugs)	
Celecoxib	Celebrex, Celxib, Cybec, Zobrex, Painex
Diclofenac	Dosanac, Uniren Spray, Antenac, Lesflam, Cataflam, Voltaren
Etoricoxib	Exib, Eberil, Biocoxib, Icoxib, Nacoxib
Ibuprofen	Advil, Motrin, Rufen, Ambufen, Coprofen, Greatofen, Gofen, Nurofen, Bunofen, Heidi,
Meloxicam	Melox, Melcam, Mobic

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Naproxen	Annoxen-S, Anaprox, Soproxen, Sonap, Naproflex
Piroxicam	Flamic, Sefdene, Piram, Roxifen
Sulindac	Clinoril, Cenlindac
Tenoxicam	Seftil, Tenax
8. Anti-gout agents	
Allopurinol	Alinol, Allomaron, Allopin, Alloric
Benzbromarone	Narcaricin, Benarone
Colchicine	Cochic, Colchily, Colcine, Goutichine, Tolchicine
Febuxostat	Feburic
Potassium citrate	Acalka
Potassium citrate + Sodium citrate	Pocitrin Tab
Probenecid	Bencid
Sulfinpyrazone	Sulfin
NSAIDs (Non-steroidal Anti-inflammatory drugs)	
Celecoxib	Celebrex, Celxib, Cybec, Zobrex, Painex
Diclofenac	Dosanac, Uniren Spray, Antenac, Lesflam, Cataflam, Voltaren
Etoricoxib	Exib, Eberil, Biocoxib, Icoxib, Nacoxib
Ibuprofen	Advil, Motrin, Rufen, Ambufen, Coprofen, Greatofen, Gofen, Nurofen, Bunofen, Heidi,
Meloxicam	Melox, Melcam, Mobic
Naproxen	Annoxen-S, Anaprox, Soproxen, Sonap, Naproflex
Piroxicam	Flamic, Sefdene, Piram, Roxifen
Sulindac	Clinoril, Cenlindac
Tenoxicam	Seftil, Tenax
9. Antihyperlipidaemic reducing agents	
Acipimox	Olbetam
Atrovastatin	Crestor, Lipitor
Bezafibrate	Bezalip Retard, Bezamil, Polyzalip
Cholestyramine	Questran Light, Resincolestiramina
Fenofibrate	Lexemin, Lipanthyl/Lipanthyl 200 M, Supralip 160
Fluvastatin	Lescol/Lescol XL

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Gemfibrozil	Bisil/ Bisil 600, Deopid, Dropid, Gemfibril, Gemfibrozil, Gozid, Hidil, Lipidys, Lipison, Lipolo, Lipozil, Locholes, Lopid/Lopid OD, Manobrozil, Mariston, Norpid, Pharzil, Poli-Fibrozil, Polyxit, Tiba
Nicotinic acid	Nicotabs
Pravastatin	Mevalotin, Mevalotin Protect
Simvastatin	Bestatin, Eucor, Lochol, Simvor, Torio, Vascor, Zimmex
10. Antihypertensive agents	
Amiloride + HCTZ	Hyperretic, Moduretic, Poli-uretic
Amlodipine	Amlopine, Norvasc
Atenolol	Atenol, Coratol, Nolol, Nortelol, Oraday, Prenolol, Tenocor, Tenolol, Tenormin
Captopril	Capoten, Epsitron, Gemzil, Tensiomin
Clonidine	Carpil
Diltiazem	Alitiazem, Angizem, Cascor XL, Dilem, Dilizem, Dilzem, Ditzem, Herbesser
Doxazosin	Cardura
Enalapril	Anapril, Enam, Enapril, Enaril, Invoril, Nalopril, Naritec, Renitec
Felodipine	Felim, Felodipin Stada, Plendil
Hydralazine	Cesoline Y
Hydrochlorothiazide	Dichlotride, Dinazide, Dyazide, Dyterene, Hychlozide, Hydrozide
Lisinopril	Lispril, Zestril
Losartan+HCTZ	Fortzaar
Mannitol	Mannitol
Methyldopa	Aldomet, Dopamed, Isomed, Medopa
Metoprolol	Betaloc, Cardeloc, Melol, Metoblock, Metolol, Minax
Minoxidil	Loniten, Modil, Noxidil
Prazosin	Atodel, Lopress, Minipress
Propranolol	Atensin, Betapress, Cardenol, Inderal, Normpress, Pralol
Ramipril	Corpril, Tritace
Spironolactone	Aldactone, Altone, Hyles

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
11. Antimalarial agents	
Artemisinin	Alaxin, Armiqin, Artequik, Dimisinex
Atovaquone	Mepron
Chloroquine	Aralen, Malacin, Chewoquine, Nitaquin, Sinmoquin
Clindamycin	Acnocin, Rosil, Todacin, Clinott, Klinna, Klinda RX
Doxycycline	Siadocin, Policyclin, Doxylcap, Doxin, Madoxy
Mefloquine	Mequin, Lariam
Primaquine	PMQ, Primacip, Primax, Tpquin
Proguanil	Malanil
Pyrimethamine	Daraprim
Quinine	Genin, Alquinn
Sulfadoxine	Vinsilar
12. Antiplatelet medicines	
Clopidogrel	Plavix
Prasugrel	Effient
Ticagrelor	Brilinta
Ticlopidine	Aplaket, Siclot, Ticlid, Ticlo, Tilopin, Tipidine, Viladil
Vorapaxar	Zontivity
13. Anti-psychotic agents	
Clozapine	Clozaril
Diazepam	Azepam, Diano, Diapam, Diapine, Dizan, Dizepam, Sipam, Stesolid, Valium, Zopam
Fluphenazine	Deca, Pharnazine
Haloperidol	H- TAB, Haldol, Halomed, Halopol, Haricon, Haridol, Perida, Polyhadon, Tensidol
Perphenazine	Pernamed, Pernazine, Conazine, Porazine
Phenytoin	Dilantin, Ditoin, Ditomed, Fenitoina Rubio
Pimozide	Orap/Orap forte, Pizide
Pinazepam	Domar
Prochlorperazine	Prochlorperazine
Quetiapine	Seroquel

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Risperidone	Risperdal
Thioridazine	Thiomed
Tofisopam	Grandaxin
Trifluoperazine	Psyrazine, Triflumed
Valproate Na	Depakine, Valparin
Ziprasidone	Zeldox
Zuclopenthixol	Clopixol

14. Anti-anxiety agents, Antidepressants and Anti-insomnia agents

Clorazepate	Anxielax, Cloramed, Cloraxene 5, Diposef, Dipot, Flulium, Manotran, Polizep, Pomadom, Posene, Sanor, Serene, Trancap, Tranclor, Trancon, Tranxene, Zetran-5
Desvenlafaxine	Pristiq, Pristig
Diazepam	Azepam, Diano, Diapam, Diapine, Dizan, Dizepam, Sipam, Stesolid, Valium, Zopam
Dothiepin	Prothiaden
Escitalopram	Lexapro
Ethyl loflazepate	Victan
Flunitrazepam	Rohypnol
Fluoxetine	Anzac, ATD- 20, Deproxin, Flumed, Fluoxetine, Flusac, Flutine, Fluxetil, Fluoxetine Atlantic, Fluzac-20, Loxetine- 20, Magrilan, Oxetine 20, Oxsac, Prodep, Unprozy
Flupentixol	Fluanxol
Flupentixol + Melitracen	Deanxit
Flurazepam	Dalmadorm
Fluvoxamine	Faverin, Fluvoxin
Haloperidol	H-TAB, Haldol, Halomed, Halopol, Haricon, Haridol, Perida, Polyhadon, Tensidol
Hydroxyzine	Atarax, Histan, Honsa, Hydroxin
Imipramine	Celamine, Sermonil, Topramine
Lamotrigine	Lamictal
Lithium carbonate	Licarb, Limed, Lit 300, Phanate, Eskalith
Lorazepam	Anta, Anxira, Ativan, Lonza, Lora, Loramed, Lorapam, Lorazep, Lorazepam Macrophar, Ora, Razepam
Maprotiline	Ludiomil

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Mianserin	Mealin, Mianserin Remedica, Ornate, Servin, Tolimed, Tolvol
Midazolam	Dormicum, Midazol
Mirtazapine	Remeron
Moclobemide	Aurorix
Nitrazepam	Nitrados
Nortriptyline	Norline, Nortrilen, Nortyline, Ortrip
Paroxetine	Seroxat
Perphenazine	Pernamed, Pernazine, Conazine, Porazine
Perphenazine + Amitriptyline	Anxipress-D, Neuragon-A/Neuragon-B
Phenobarbital	Gardenal, Menobarb, Phenobarbital Atlantic, Phenotal
Pinazepam	Domar
Prazepam	Pozapam, Prasepine
Prochlorperazine	Prochlorperazine
Sertraline	Zoloft
Temazepam	Euhypnos
Thioridazine	Thiomed
Tianeptine	Stablon
Tofisopam	Grandaxin
Trazodone	Desirel
Triazolam	Halcion, Trycam
Trifluoperazine	Psyrazine, Triflumed
Zolpidem hemitrate	Stilnox
15. Anticonvulsants	
Gabapentin	Neurontin
Lamotrigine	Lamictal
Levetiracetam	Kepra
Lorazepam	Anta, Anxira, Ativan, Lonza, Lora, Loramed, Lorapam, Lorazep, Lorazepam Macrofar, Ora, Razepam
Nitrazepam	Nitrados
Oxcarbazepine	Trileptal
Phenobarbital	Gardenal, Menobarb, Phenobarbital Atlantic, Phenotal
Phenytoin	Dilantin, Ditoin, Ditomed, Fenitoina Rubio

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Topiramate	Topamax
Valproate Na	Depakine, Valparin
16. Aspirin and NSAIDs ที่นอกเหนือจากการใช้ใน Arthritis	
Aspirin	Actorin, Alka-Seltzer, Aspent, Aspent-M, Aspilets, Aspirin BD, Bayer Aspirin, Caparin 100, Cardiprin 100, Entrarin, Seferin-5/Seferin-10, V-AS
NSAIDs (Non-steroidal Anti-inflammatory drugs) ที่นอกเหนือจากการใช้ใน Arthritis	
Indomethacin	Indocin, M-CIN, Indomed, Elmetacin
Ketoprofen	Orudis, Oruvail
Ketorolac	Toradol
Meclofenamate	Meclomen
Mefenamic Acid	Mefenan, Ponstan, Coly
Nabumetone	Aflex, Fafex, Naflex, Relafen
Oxaprozin	Daypro
Phenylbutazone	Butarzol, Butazone, Phenazone
17. Bronchodilators and decongestants	
Aminophylline	Amino Patar
Bambuterol	Bambec
Ephredine	Emerphed, Akovaz, Corphedra
Naphazoline	Privine
Oxymetazoline	Feenoze, Iliadin, Metzodin, Oxymet
Phenylephrine	Sudafed PE Congestion, Neo-Synephrine, Sudogest PE, Biorphen
Phenylpropanolamine	Phenylidine, Propan, Dexatrim, Empro
Pseudoephedrine	Sudafed, SudoGest
Salbutamol	Aerotamol, Ventolin, Sabumol, Bronchosol, Naso
Terbutaline	Asmaline, Broncholine, Tolbin, Terbu, Asthmic
Tetrahydrozoline	Tyzine Nasal, Tyzine Pediatric Nasal, Tyzine
Theophylline	Asmasolon, Nuelin SR, Theolin, Duralyn-CR
Xylometazoline	Actavia, Otrivin

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
18. Contraceptive agents	
Contraceptives ยาคุมกำเนิดทุกประเภท	Anamai, Anna, Contracep, Depo- gestin, Depo- progesno, Depo- progesta, Depo- provera sterile aqueous suspension, Exluton, Gynera/Gynera ED, Implanon, Jeny-FMP, Lyndiol 50 E, Madonna, Marvelon 21/ Marvelon 28, Meliane, Mercilon 21/Mercilon 28, Medeton, Noristerat, Microgest ED, Microgynon 30 ED, Multiload CU 375 SL, Nordette- 21/Nordette- 28, Norplant, Postinor 2, R-DEN, Riget 21+7, Sucee, Triquilar ED, Yasmin
19. Dermatologicals	
Amcinonide	Visderm
Betamethasone	Betosone, Besone, Betnovate, Bepronate
Ciclosporin	Cipol-N, Equoral, Sandimmun, Kasporin
Clobetasol	Clonovate, Clinoderm, P-Vate, Dergemate
Dexpanthenol	Bepanthen
Hydrocortisone	Hytisone, H-Cort, Efficort
Mometasone	Momate Cream, Elomet
Mupirocin	Muporin, Bacidal, Macroban, Supirocin
Nitrofurul	Densa
Pimecrolimus	Elidel
Prednisolone	Clinipred
Silver sulfadiazine	Silverderm, Dermazin
Tacrolimus	Advagraf, Prograf
Tranexamic acid	Transamin, Lysteda, Cyklokapron
Triamcinolone Acetonide	Ftorocort, Kela, Kelamild, Kemzid, Simacort Cream
Ubidecarenone	Sebamed
Urea	DiabeDerm, Ureaten, UO Cream, Nutraplus
Zinc oxide	Nappy-Hippo, Sam-Ko
20. Dieting	
Weight reduction pills	
Orlistat	Xenical
Phentermine	Panbesy
Sibutramine	Reductil

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
21. Eye preparations	
Atropine	Atroren-P, Isopto atropine
Benzalkonium chloride + Tobramycin	DW Tobramycin
Chloramphenicol	Chloroph, Cogetine, Silmycetin
Cyclopentolate	Cyclogyl
Dexamethasone + Chloramphenicol + Tetrahydrozoline	CD-Oph
Dexamethasone + Neomycin	Archidex, Eyedex, Dexoph, Dexylin, Cadexcin-N
Dexamethasone + Neomycin + Polymyxin B	Maxitrol
For Allergic conjunctivitis (ตาอักเสบจากการแพ้)	Hista-Oph, Allergis, Flu Oph
Fusidic acid	Fucithalamic
Loteprednol	Alrex, Lotemax,
Loteprednol etabonate + Tobramycin	Zylet
Moxifloxacin	Svoz, Cravit, Vigamox
Moxifloxacin	Vigamox
Prostaglandin analogues ได้แก่ Bimatoprost, Latanoprost, Travoprost	Prosdrop, Lanotan, Lumoprost, Lumigan, Ganfort, IZBA, Duotrav BAK-free, Travatan
Timolol	Glauco-Oph
Tobramycin	Tobrex
Topiramide	Mydriacyl
น้ำตาเทียม (artificial tears)	Lac-Oph, Natear UD, Seeview sofs
22. Gastrointestinal medications	
Aescin	Reparil-Dragees
Antacids ยาลดกรด	Algycon, Alum gel, Belcid, Silomed, Ziga
Benzocaine + Hydrocortisone acetate + Zinc oxide	Doproct
Diosmin + Hesperidin	Daflon, Dafomin, Diosmin, Meslon, Flavon
Fluocortolone pivalate + Lidocaine hydrochloride	Scheriproct N
Histamine 2-Receptor Antagonists (H2RAs) ได้แก่ Cimetidine, Ranitidine, Famotidine	Ulcemet, Cigamet, Siamidine, Ranidine, Acicare, Ranicid, Pepfamin, Ulceran, Famopac

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Prokinetic agents เช่น Domperidone, Metoclopramide	Motilium, Peridom-M, Avomit, Plasil, Maril
Proton Pump Inhibitors: PPIs ได้แก่ Omeprazole, Rabeprazole, Pantoprazole	Miracid, Prazole, Desec, Omicap, O-Sid, Gaster, Eucid, Gomec, Stomec, Ulpracid
สำหรับอาการท้องเสีย (diarrhea)	Besmal, Bioflor, Dehecta, Lomide, Impilium, Carbon, Smecta, Charcoal, Disento, Imodium
สำหรับอาการท้องผูก (constipation)	Mucilin, Milk of Magnesia, Senokot, Dulcolax, Hepalac, Bisacod, Bisacodyl, Emulax, Senna

23. Hair loss treatment medicines

Dutasteride	Avodart, Uroka, Dueride, Duagen
Finasteride	Propecia, Proscar, Benstat, Firide
Minoxidil	Midil, Regrowth, Nuhair, MI-X, Reten, Loniten

24. Heart Disease and Medications

Abciximab	ReoPro
Digoxin	Toloxin, Cardial, Grexin, Lanoxin
Ivabradine	Coralan
Nicorandil	Ikorel, Angedil
Nitrates ได้แก่ Isosorbide dinitrate/mononitrate	Hartsorb, Corodil, Isobinate, Imdex, Monosorb, Sorbinate, Solotrate, Monolin
Ranolazine	Ranexa
Thrombin Inhibitors เช่น Argatroban, Bivalirudin	Acova, Angiomax
Tirofiban	Aggrastat
Tolvaptan	Samsca, Jynarque
Trimetazidine	Matenol, Vastarel, Vastinol, Metagem, Trizidine

ดูเพิ่มเติม ในหัวข้อที่ 5. Anticoagulation agents, 10. Antihypertensive agents และ 12. Antiplatelet

25. Hormones

Aminoglutethimide	Elipten, Cytadren, Orimeten
Growth Hormone	Genotropin, Norditropin, Humatrope, Norditropin FlexPro
Hormone Replacement Therapy (HRT)	Alora, Cenestin, Fentrace, Ogen, Prometrium, Provera, Femhrt, Prefest, Activella, Angeliq, Prempro, Duavee
Testosterone replacement therapy (TRT)	Aveed, Depo-Testosterone, Delatestryl, Testopel

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
26. Immunization	
Chicken Pox (varicella)	Varivax
Cholera	Metacol Berna (oral)
Diarrhea (traveller's)	Dukoral (oral)
Diphtheria, Tetanus, Pertussis	Adacel, Boostrix
Encephalitis, Japanese	Ixiaro
Hepatitis A	Avaxim, Epaxal, Havrix, Vaqta, Vivaxim
Hepatitis A and Hepatitis B	Twinrix
Hepatitis B	Engerix B, Recombivax-HB
Herpes Zoster (Shingles)	Shingrix, Zostavax
Human Papillomavirus	Gardasil, Cervarix
Influenza	Fluviral, Influvac, Arepanrix (H1N1), Panvax (H1N1), Vaxigrip, Agriflu, Intanza, Flumist intranasal
Measles, Mumps, Rubella	MMR
Measles, Mumps, Rubella, varicella	MMRV
Meningococcal	Meningitec, Menjugate, Menactra, Menveo, Nimenrix, Bexsero
Mumps	(MMR)
Pneumococcal	Pneumovax, Prevnar, Pneumo 23
Polio	Salk, Imovax, IPV (injection), Sabin (oral)
Rabies (post-exposure immunization)	Rabies Immune Globulin
Rabies (pre-exposure immunization)	RabAvert
Rubella (German Measles)	MMR
Tick Borne Encephalitis	FSME-IMMUN
Typhoid	Vivotif (oral), Typherix, Typhim Vi
Typhoid, Hepatitis A	Vivaxim
27. Mild analgesics and Muscle relaxants	
Eperisone	Espenal, Musolax, Myonal, Ralexia
Paracetamol	Acetasil, Algogen, A-MOL, Biogesic, Calpol/Calpol PED, Cemol, Daga, KIT-Syrup, Lotemp, Mypara, Panadol, Paracap, Paracet, Paramol, Parat, Paratol, Partamol, Pemol, Pyracon, Pyretal, Ramol, Tumdi, Tylenol, Tymol, Unimol, Xebromol

ชื่อสามัญ (Generic Name)	ชื่อการค้า (Trade name)
Paracetamol + Orphenadrine	Dorpane, Medgesic, Muscol, Myodrine, Myoflex, Myosic, Myospa, Nabesac, Neosec, Norphen, Nurasic, Orlex, Orpar, Orphengestic, Poli-Relaxane, Polydol, Relar, Rena,
Tolperisone HCl	Biocalm, Musocalm, Mydocalm, Mydono, Mydosone, Myoxan, Risocalm, ShivalaxSoneriper/Soneriper S, Tanderon,
28. Steroids	
Bethamethasone	Celestone
Budesonide	Pulmicort
Dexamethasone	Dexamethasone Intensol, DexPak
Fludrocortisone	Florinef
Fluticasone	Flovent, Arnuity Ellipta
Hydrocortisone	Cortef
Methylprednisolone	Medrol, Depo-Medrol, Solu-Medrol
Prednisolone	Orapred, Prelone
Prednisone	Prednisone Intensol
Triamcinolone	Aristospan Intra-Articular, Aristospan Intralesional, Kenalog
29. Vitamins และอาหารเสริมต่าง ๆ	
Fish oil และ ขมิ้นชัน (Curcumin)	-
Glucosamine Sulfate	Viartril-S, Coxium, Glucosa, Kosamine, Glutril
Vitamins	-
อาหารเสริม ยกเว้น Fish oil และ ขมิ้นชัน	-
อาหารเสริมลดน้ำหนักประเภท L-carnitine	-
อาหารเสริมอื่น ๆ เช่น กลูต้าไธโอนชนิด รับประทาน คอลลาเจนชนิดรับประทาน สารสกัด คลอโรฟิลล์	-

เอกสารอ้างอิง

1. American Red Cross [Internet]. Medication Deferral List. [Cited 2020 June 26]. Available from: https://www.redcrossblood.org/content/dam/redcrossblood/missing-documents/3468_Medication-Deferral-List.pdf
 2. Australian Red Cross Lifeblood [Internet]. Eligibility FAQs. [Cited 2020 June 26]. Available from: <https://www.donateblood.com.au/faq-list>
 3. Canadian Blood Services [Internet]. ABCs of eligibility to donating blood. [Cited 2020 June 26]. Available from: <https://www.blood.ca/en/blood/am-i-eligible/abcs-eligibility-donating-blood>
 4. Joint United Kingdom (UK) Blood Transfusion and Tissue Transplantation Services Professional Advisory Committee [Internet]. Donor Selection Guidelines. [Cited 2020 June 28]. Available from: <https://www.transfusionguidelines.org/dsg/wb/guidelines>
 5. NHS Blood Donation [Internet]. Health and Eligibility. [Cited 2020 June 26]. Available from: <https://my.blood.co.uk/knowledgebase/>
 6. World Health Organization [Internet]. Blood donor selection: guidelines on assessing donor suitability for blood donation; 2012 [Cited 2020 June 26]. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/76724>
-