

# การบริจาคส่วนประกอบโลหิต

## (Cytapheresis)

การบริจาคส่วนประกอบโลหิต เช่น บริจาคพลาสมา, เกล็ดเลือด, เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว คือ การเจาะเลือดของท่านออก แล้วนำไปปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นแยกโลหิตอัตโนมัติ (Blood cell separator) ซึ่งจะแยกส่วนประกอบเลือดของท่านออกเป็นพลาสมา, เกล็ดเลือด, เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว เครื่องจะเก็บส่วนที่ท่านบริจาคไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป และส่วนประกอบเลือดอื่นๆที่ท่านไม่ประสงค์บริจาคทั้งหมดจะคืนกลับตัวท่านทันที

### ต้องการบริจาค

- บริจาคพลาสมา
- บริจาคเกล็ดเลือด
- บริจาคเม็ดเลือดแดง
- บริจาคเม็ดเลือดขาว

ข้าพเจ้าทราบว่า การบริจาคส่วนประกอบโลหิตนี้ สามารถบริจาคได้โดยไม่เป็นอันตรายร้ายแรง อาจมีผลข้างเคียงบ้าง เช่นเดียวกับการบริจาคโลหิตทั่วไป เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, หน้ามืด, เวียนศีรษะและเขียวช้ำบริเวณที่เจาะ

ในการบริจาคส่วนประกอบโลหิตนี้ใช้ ACD-A เป็นน้ำยาต้านเลือดแข็งตัว ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อย คือรู้สึกชาบริเวณริมฝีปาก, หน้าหรือปลายมือ เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อได้รับแคลเซียมเสริมโดยการรับประทาน หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ อาการต่างๆจะดีขึ้นและหายไปเอง

ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายข้อความข้างต้นนี้แล้วและเข้าใจผลดี และผลข้างเคียงจากการบริจาคส่วนประกอบโลหิตและยินดีที่จะบริจาคส่วนประกอบโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปให้ผู้ป่วยด้วยความสมัครใจและไม่เรียกร้องหากเกิดกรณีใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อผู้บริจาค.....

(.....)

วันที่.....